

EPISODE 5-2

— 不幸は身近に —

▼ Surgeon



▼ Data

【患部】 肝臓
【バイタル】 40 (75)
【手術時間】 5:00:00

▼ Notes



事故により、内臓損傷を起こしている患者を治療する。開いた傷口に人工皮膚を乗せるガーゼパッキング処理に挑むことになる。

The patient's Life is in your hands

- 1 腹部を消毒して切開 (切開→P24)
- 2 カウンターショックで心拍を復活させる
- 3 血溜まりをすべて吸引する (血溜まり→P24)
- 4 追加トレイの人工膜を損傷部分 (8カ所) すべてに置く (ガーゼパッキング→P35)
- 5 人工膜を定着させる (ガーゼパッキング→P35)
- 6 心細動が発生 (心細動→P31)
- 7 裂傷×6を縫合 (裂傷→P23)
- 8 腹部の閉創処置を行なう (閉創→P25)

The patient is saved



- 1 すぐに心停止が発生してバイタルが低下するため、切開時はバイタルの回復をしないですそのまま手順を進めよう。



- 4 損傷部以外の血溜まりまですべて吸引しておけば、心細動が発生するまで血溜まりは再発しない。



- 5-1 人工膜を8カ所すべてに置く。と血溜まりは発生しなくなる。あとはヒールゼリーを塗り、皮膚を定着させよう。



- 5-2 人工膜を配置中に1回目の心細動が発生する。本震に移行したときに処置をするとミスになる。




- 7 2回目の心細動が本震になるまでに裂傷をすべて縫い終わりたい。難しいなら手を休めて次の準備をしておこう。



- 8 バイタルが低下しているの、高得点クリアを狙うなら、保護テープを張るまでにバイタルを最大まで回復させる。

血溜まりの再発タイミング



肝臓の破損部分は、マスごとに血溜まりの発生タイミングが設定されている。全部で4段階あり、左図に記した①②③④の順で再発が早くなる。

SPECIAL BONUS

SPECIAL BONUS 獲得条件

	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.3
〇〇秒以上残して手術終了 *	220	240	245	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	25	30	32	1.2
剥がれた人工膜の枚数〇〇枚以下	12	8	3	1.3

*分表示ではそれぞれ、Easy2:40 Normal3:00 Hard3:05

OPERATION RANK

	Easy	Normal	Hard
ランク			
C	0 ~ 1799	0 ~ 2899	0 ~ 4299
B	1800 ~ 1999	2900 ~ 3199	4300 ~ 4599
A	2000 ~ 2099	3200 ~ 3499	4600 ~ 4999
S	2100 ~	3500 ~	5000 ~ 5099
XS	—	—	5100 ~

EPISODE 5-3

— 暗転 —

▼ Surgeon



▼ Data

【患部】 肝臓
【バイタル】 65 (90)
【手術時間】 5:00:00

▼ Notes




ガーゼパッキング処理で治療した肝臓の再手術を行なう。症状が悪化した原因を突き止めるべく、再び術式を開始する。

The patient's Life is in your hands

- 1 腹部を消毒して切開 (切開→P24)
- 2 肝臓の左下に発生している血溜まり×3のみを吸引 (血溜まり→P24)
- 3 血溜まりの下にあった内出血×3を特定し、患部を切開 (内出血→P29)
- 4 内出血の血溜まり×3を吸引し、吸引した順番で切開×3を縫合 (内出血→P29)
- 5 肝臓の右上に発生している血溜まり×3のみを吸引 (血溜まり→P24)
- 6 血溜まりの下にある内出血×4を特定し、3~5の手順で内出血を処置 (内出血→P29)
- 7 心細動が発生 (心細動→P31)
- 8 損傷部分の血溜まりが発生しなくなるまで吸引 (ガーゼパッキング→P35)
- 9 ピンセットを選択し、追加トレイの人工皮膚を損傷部分 (8カ所) すべてに置く (ガーゼパッキング→P35)
- 10 人工膜を定着させる (ガーゼパッキング→P35)
- 11 腹部の閉創処置を行なう (閉創→P25)

The patient is saved

血溜まりの再発タイミング



72ページと同じように肝臓の破損部分には、マスごとに血溜まりの発生タイミングが設定されている。左図に記した①②③④の順で再発が早くなる。



- 2 内出血の影を表示させずに切開したほうが得点が高くなる。近辺にメスを入れ、スライドし続けて切開しよう。



- 4 内出血の血溜まりは再発が早い。縫合するときは吸引した順に縫わないと、途中で血溜まりが発生してしまう。



- 7-1 手順が遅いと内出血の処置中に心細動が発生する場合がある。必ず手を止めて正常に戻るまで待機すること。



- 7-2 心細動が発生し、一定時間経過したときに作業を行っていると「Miss」判定になり、必ず心停止が起きる。



- 8-1 吸引中に再発した血溜まりも合わせて一気に吸い取ろう。損傷部分の血溜まりがなくなったら次の手順へ進む。



- 8-2 血溜まりを途中で吸い止めたもの、心細動で手を止めた場合は、破損部分の血溜まりが再発するまで待つ。

SPECIAL BONUS

SPECIAL BONUS 獲得条件

	Easy	Normal	Hard	倍率
Miss 判定無し				1.3
〇〇秒以上残して手術終了 *	150	180	190	1.2
MAX CHAIN 〇〇〇以上	40	50	60	1.2
剥がれた人工膜の枚数〇〇枚以下	15	10	6	1.3

*分表示ではそれぞれ、Easy2:30 Normal3:00 Hard3:10

OPERATION RANK

	Easy	Normal	Hard
ランク			
C	0 ~ 2499	0 ~ 3799	0 ~ 5299
B	2500 ~ 2699	3800 ~ 4099	5300 ~ 5599
A	2700 ~ 2799	4100 ~ 4499	5600 ~ 5899
S	2800 ~	4500 ~	5900 ~ 5999
XS	—	—	6000 ~